

リリカ®服用にあたってのご注意

- このお薬は、めまいや眠気、意識消失があらわれることがあります。
 - 特に高齢の方は、転倒の危険がありますので、十分に注意してください。
 - 服用中は事故の危険がありますので、自動車などの運転や危険を伴う機械の操作をしないでください。
- 人により体重が増えることがありますので、気になる徴候があらわれた場合には、ご相談ください。
- 腎臓が悪い方、透析をうけている方、心臓が悪い方、妊娠中または授乳中の方は、必ずご相談ください。
- ほかにお薬を服用している場合（薬局で買ったお薬も）、必ずお伝えください。
- アルコールはお薬の作用を強めることがありますので、注意してください。
- 誤って多く服用した場合はご相談ください。
- ご自分の判断で服用を中止したり、服用量や服用回数を変更せず、必ず医師にご相談ください。
- 服用を急に中止すると、頭痛、下痢などがあらわれることがあります。
- 服用をやめるときは、1週間以上かけて、徐々に量を減らしていきます。必ず医師と相談しながら進めてください。

気になる症状がある場合、わからないことがある場合は、医師または薬剤師にご相談ください。



患者さんとそのご家族の方に
リリカ®の服用方法や主な副作用について
サイト内でご紹介しています。

リリカ®服用に関する情報サイトへの
アクセス方法

リリカナビ で 検索 または
スマートフォン・携帯からはQRコードの読み取り

