

変形性関節症※にともなう痛み


慢性腰痛にともなう痛み

医療関係者用

※変形性関節症は肩や手、膝などの関節で起こります。
ここでは例として腰で説明しています。

サインバルタがはらく場所

“痛み”を感じる



サインバルタがはらく場所

“痛み”を感じる



監修：小幡英章先生
福島県立医科大学附属病院
痛み緩和医療センター教授

シオノギ製薬

CYMP-C-0010(V01) 増177345

Slee 日本イーライリリー株式会社


2017年12月作成

サインバルタの痛みをおさえられる効果があります

サインバルタの飲み方

1日1回、朝食後に服用します

少量から飲み始めるのは、副作用が起こる可能性を低くするためです。
そこで、20mgで1週間以上服用したあと、副作用の様子をみながら40mgに増やします。
40mgを1週間以上服用したのちに通常用量60mgまで増やします。



サインバルタがおられるまでに 飲み始めてかかる数週間かかります

※効果があらわれる期間には個人差があります

通常用量

20mg × 3カプセル 30mg × 2カプセル

または

中止するときは
少しずつ服用量を減らします。
(急に服用を中止したり、飲む量を減らすと
気分の変調や頭痛・ムカムカなどの症状が
あらわれることがあります。)

